

# CALENDRIER DE VACCINATION PAR BEXSERO

Selon l'âge du patient, le médecin, le pharmacien ou l'infirmière injectera BEXSERO dans le muscle du bras ou de la jambe.

## CALENDRIER DE VACCINATION RECOMMANDÉ :

Âge à l'administration de la première dose	Primovaccination		Dose de rappel (0,5 mL)
	Doses de primo-vaccination <i>Chaque dose contient 0,5 mL.</i>	Intervalle entre les doses de primo-vaccination	
<b>Schéma posologique 2+1</b>			
<b>Nourrissons</b> âgés de 2 à 5 mois*†	<b>2</b>	<b>≥ 2</b> mois	<b>1 dose</b> doit être administrée au cours de la 2 <sup>e</sup> année de vie; intervalle d'au moins 6 mois après la dernière dose de la primovaccination†.
<b>Nourrissons</b> âgés de 6 à 11 mois	<b>2</b>	<b>≥ 2</b> mois	<b>1 dose</b> doit être administrée au cours de la 2 <sup>e</sup> année de vie; intervalle d'au moins 2 mois après la dernière dose†.
<b>Enfants</b> âgés de 12 à 23 mois	<b>2</b>	<b>≥ 2</b> mois	<b>1 dose</b> doit être administrée entre 12 et 23 mois après la deuxième injection†.
<b>Enfants, adolescents et adultes</b> âgés de 2 à 25 ans	<b>2</b>	<b>≥ 1</b> mois	<b>1 dose</b> peut être envisagée chez les personnes présentant un risque continu d'exposition à la méningococcie.

### Date d'administration de la dose initiale:

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

\* La première série peut aussi être donnée en 3 injections à un intervalle d'au moins 1 mois entre les doses de primovaccination. Une dose de rappel sera administrée durant la 2<sup>e</sup> année de vie, au moins 6 mois après la dernière dose de la primovaccination.

**La vaccination contre la méningite B<sup>‡</sup> ne fait pas partie du calendrier de vaccination systématique de votre enfant. Aidez à protéger votre enfant contre la méningite B<sup>‡</sup> avec BEXSERO.**

Veillez vous référer à la notice pour des informations complètes sur la posologie.

† La nécessité de doses supplémentaires et le moment où elles devraient être administrées n'ont pas été déterminés à ce jour.

‡ Méningococcie invasive du sérotype B causée par les souches de *Neisseria meningitidis* du groupe B.